

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 19-8-69 956142

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 1 au Bulletin du mois d'Août 1969

11 Août 1969

Avertissement

GRANDES CULTURES

- POMMES DE TERRE -

MILDIOU

Bien que des taches de Mildiou sur feuillage soient apparentes dans certaines parcelles de variétés sensibles, le champignon n'évolue que très lentement.

Cette évolution risque cependant d'être brutale si des pluies orageuses devaient se produire dans les prochains jours.

Ainsi, il paraît utile d'envisager une nouvelle protection fongicide des parcelles dont on désire prolonger la végétation et de prévoir le défanage des variétés arrivant à maturité.

Le but du défanage chimique est de détruire la végétation herbacée afin de stopper l'évolution du Mildiou et de préserver les tubercules des attaques de cette maladie.

Parmi les produits défanants couramment utilisés, on pourra retenir :

D.N.O.C. : Très actif à une température supérieure à 15°. Il s'utilise à la dose de 20 à 25 kg/ha.

DIQUAT : Si le défanage est envisagé avec ce produit, il est préférable de traiter le soir ou par temps couvert. Se conformer aux doses prescrites par le fabricant.

DINOSEBE : S'utilise à 2,600 kg de matière active/hectare. L'efficacité du Dinosèbe sera augmentée par addition de 40 à 50 litres de fuel.

CHLORATE DE SOUDE : Son emploi ne permet pas d'obtenir une dessiccation totale des fanes. D'autre part, son action résiduelle dans le sol peut être nocive pour la culture suivante. Mettre en oeuvre 20 à 30 kg de Chlorate de soude à l'hectare.

La pulvérisation devra être fine, homogène et apporter un minimum de 1.000 litres d'eau à l'hectare. Travailler sous forte pression, de façon à mouiller les tiges jusqu'à leur base.

.../...

48

H O U B L O N

MILDIOU

Les cônes étant très sensibles aux attaques de Mildiou, il est recommandé de renouveler le traitement fongicide dès réception du présent avis.

Effectuer un traitement mixte en cas de présence de Pucerons ou d'Araignées rouges.

V I G N E

(Valable pour les vignobles de la région de CLEEBOURG)

TORDEUSES DE LA GRAPPE (2ème génération)

Les vols de Cochylis se poursuivent dans les vignobles de la région de CLEEBOURG. Compte tenu de la relative importance de ces vols, un deuxième traitement devrait être envisagé dans les situations habituellement contaminées.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

La période chaude et ensoleillée qui s'est installée sur nos régions, reste favorable à l'activité du Carpocapse.

Le vol des papillons de deuxième génération a débuté depuis quelques jours et les premières pontes peuvent être observées actuellement.

En conséquence, un traitement insecticide est conseillé sur l'ensemble des plantations.

Intervenir dès réception de la présente note.

Sur les variétés hâtives, choisir les produits en fonction des limitations d'emploi en vigueur.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.